



ILLUSTRISSIMO VIRO
AMORI CIVIUM, URBIS PRÆSIDIO,
D. D.

ANTONIO-RAYMONDO-JOANNI-GUALBERTO-GABRIELI

DE SARTINE,
REGIS IN SACRO CONSISTORIO CONSILIARIO,
URBANÆ POLITIÆ MODERATORI VIGILANTISSIMO,
IN CONSULTISSIMA FACULTATE DOCTORI HONORARIO, &c. &c.

*QUÆ plurima fert secum negotia multiplex & immensus rerum à te gerendarum ordo, VIR ILLUSTRIS-
SIME, hæc omnia simul indefessâ mentis acie complecteris, mirâ
perpendis cum facilitate, prudenti moderaris Consilio, præ
summâ æquitate, maturâque Sagacitate jugiter absolvīs.*

Magnatibus acceptus, Plebi carissimus, apud singulos gratiosus, omnium tibi pariter animos concilias & reverentiam. Laus indè tua est, Nominis Gloria, Civium utique cum securitate Felicitas. Carior profectò mihi benevolentiae tuæ spes honorifica, pretiosa tui Patrocinii nobilis ambitio. Tenuissimum igitur obsequii munus hocce benignus accipias, VIR ILLUSTRIS: si quid ad publicam utilitatem valeat Opusculum, eo saltem à te, quoquo modo, comprobari mereatur,

C. A. GOUBELLY,
S. F. M. P. Baccalaureus.



QUESTIO MEDICO-CHIRURGICA,
QUOD LIBETARIIS DISPUTATIONIBUS;
manè discutienda in Scholis Medicorum, die Jovis vigesima-tertia
mensis Aprilis, anno Domini M. DCC. LXXII.

M. FLORENTIO-CAROLO BELLOT,

utriusque Pharmaciae Professore designato, Professore Regio,
 Doctore Medico, Praeside.

An capite fœtus incuneato, vectis forcipibus anteposendus?

L.



BI fœtus maturus viribus maternis ex utero protrusus facilè & absque ullâ injuria in lucem editur, suâque secum trahit secundinas integras; partus dicitur *naturalis*. Solius naturæ illud opus totum est, nec ullam, aut rarè, auxiliatricem duntaxat, reposcit opem. Ubi verò naturæ conatus irritos efficiunt, aut ex parte matris, aut ex parte fœtus objecta impedimenta, quæ nisi potenti artis auxilio, vinci minimè possunt, partus votis naturæ haud consentaneus, vocatur *contra-naturalis*. Infinitas penè numero, quibus irretitur infans egressurus causas, varias quæ pro variis & causis & rerum circumstantiis proposiæ aut adhibitæ fuerunt, artes recensere, longius esset, vetantque thesèos limites. De illo partu difficili admodum & laborioso in quo caput fœtus ita incarceration atque incuneatur ut, nec citrà, nec ultrà progredi queat, de instrumento quod tutiorem partum absolvet ac promptiorem, nostra tantum erit dissertatiuncula.

Incuneatum dicimus caput, quod intra matris partes seu molles seu duras impactum & immobile hærens, nec validioribus matris moliminibus, nec obstetricantis nudâ manu potest expediri. Ex observatis, capitis zona tantum aliquando, aliquando tota peripheria constringitur; aliquando tandem spinas inter ischii osium, apicem sacri, coccygem ita caput infigitur ut, nec progressus

note 1. *Est gravum et in eductu par. et comm. m. n.*
Varnier. Vol. de Note page 205.

(Voy. Thes. obstétr. 11. 12)

fit capax, nec regressus. Illo igitur instrumento armatus accedat necesse est embryulus, quo à partibus constringentibus caput, salvis, quantum potest, & matris & foetus rebus, avellat. Forcipem curvum à Celeberrimo Levret excogitatum & absolutum laudant fere omnes. At pace viri peritissimi, cui multum debere artem obstetriciam, læti profitemur, vestem, non Roonhuyfianum quidem, sed alium, huic ex aliquâ parte similem, simpliciorē, & diversâ methodo tractandum, forcipi anteponendum existimamus.

I L

INFANTEM in lucem edendum è pelvi majori in minorem, & deinde extrâ vulvam expelli necesse est. Pelvim minorem à majori determinat foramen imperfectè ovale quod faucium vel angustiarum, superiorum nomine insignitur. Foramen illud parte superiori sacri, inferioribus illi ossium lateribus & ossibus pubis circumscribitur; unde nec circuli, nec ellipsèos formam exhibet adæquatam. Si ab uno illo ad alterum ducas lineam, diametrum transversam habebis, anteriorem verò tibi offeret linea distantiam à sacro ad pubem emetiens. Hæc priori minor est.

Pelvim minorem efformant sacrum, coccyx, ischia, pubis, ligamenta sacro-ischiatica. Foramen, quo infra terminatur pelvis minor, angustia minores nuncupatur: quod duabus diametris intersectum fingere est, unâ scilicet anteriori, ab angulo pubis ad sacri apicem ductâ, alterâ transversâ inter ambas ischiorum tuberositates.

In capite foetus duas pariter delineabimus diametros, anteriorem nempe & majorem ab osse frontali ad occiput, alteram transversam & minorem ab uno temporali osse ad alterum.

His præpositis, quid in parturitione agatur, paululum attendamus. Dùm partus instant molimina; collum uteri, caput infantis complectens, è pelvi majori in minorem propulsum, suum protendit orificium in vaginam. Caput ergo foetus angustias superiores ingredi & transilire cogitur, ut in pelvim descendat, sacro & coccygi innixurum. Dùm peragitur ille descensus, ita, pro voto naturæ, paulatim aperiri & dilatari oportet ostium uteri, ut, jam ponè caput retractum, collum cingat. Nec satis: alteræ opponuntur angustia inferiores, quas ut superet homuncio, ita caput erigendum est, ut vulvæ aperturam facies appellat, versùs pubim quasi rotante occipite. Hinc patet foetus caput, vel partibus mollibus, uteri orificio, vaginâ & vulvæ ostio, vel partibus duris angustias nempe superioribus & inferioribus posse retineri & cohiberi incuneatum.

Nec paucioribus nec minoribus differentiis incuneationem fecerit varia capitis foetus positio. Hoc enim incuneato in angustias superioribus, facies, vel dextrum, vel sinistrum spectat transversæ diametri terminum, vel occipite objecto, facies sacrum, aut pubim directè vel obliquè respicit. In cavitate pelvis minoris si locum habeat incuneatio, facies vel sacro innixa, vel publi, vel dextro sinistrove lateri objecta, hæcbit tum directè, tum obliquè ad diametrum transversam. Eadem notantur diversitate situs & respectus faciei, si caput in angustias inferioribus detineatur immobile. Qualiscumque verò sit faciei situs, qui multiformis depingi potest, præcipuas capitis lineas cum præcipuis pelvis diametris modò parallelas modò obliquas evadere; ac proindè quatuor inter se angulos, ad apicem oppositos sibi invicem modò æquales, modò inæquales efformare nemo diffitebitur. Indicatis repagulis quibus infantulo moræ injiciuntur, delineatisque

5
variis capitis positionibus, omiffis verò caufis & fignis incuneationis, quæ varios apud Autores legere eft, forcipis ufum, haud raro impoffibilem, perfpæpe noxium demonftrare jubet propofiti ratio.

III.

UT forceps, cujus figuram, utpotè omnibus notam, negligimus, propofitum adimpleat opus, hæc funt prius peragenda. 1^o. Cochlear utrumque fœtum intrâ & partes matris collocandum. 2^o. Forcipis crura inter fe certo uniantur nexu. 3^o. Crura itâ apponantur ut colligatorum margines eorum convexæ obviæ fint facro, cujus latitudo instrumenti axim fecet perpendiculariter, margines verò cavæ offium pubis crura refpiciant. Hæc enim mutatâ aut declinatâ pofitione, premantur, tundantur, imò lacerentur partes matris neceffe eft, turpiterque vacuum & inane extrahitur instrumentum. 4^o. Fœtus capiti eo forceps applicandus eft modo, quo hujus cochlearis utriusque cavitas illius diametri tranfverfæ fines comprehendat. Jam verò capite in anguftiis fuperioribus incuneato, hæc quatuor fæpiffimè defiderantur. Facie etenim vel publi vel facro adhærente, forcipis cochlearia intrò facilè miffa fuiſſe per nos nunc liceat, horum ope, in pelvim minorem nunquàm adducendum eſſe caput ultrò fatebitur, qui anguſtiarum fuperiorum longè minorem diametrum anteriorem, pro majori copitis fœtus diametro, animadvertet. Obices, vix fuperabiles, vincere fi tentet malè cautus obſtetricans, totis ſuis viribus caput avellens, in pubem aut facrum fortiter preſſus tùm anterior, tùm poſterior uteri paries certò certius contundetur, rumpetur. Nec dicas caput, digitorum ope, ad ſtatum naturalem prius eſſe revocandum; digitis nullus patet aditus, incuneatio vanam illorum efficit preſſionem; aut faltem eam illis non permittit actionem quæ capiti invertendo fit ſufficiens.

Anguſtiis in fuperioribus tranſverſum ſi caput hæreat, quominus intromittatur forceps, vetat axis cochlearis curvitas lateralis: nec contra nitatur obſtetricans fuæ encheireſed̃s tenacior, alioquin contuſas, laceratas, dolebit matris partes, deturpata, laniata fœtus capitis integumenta. Et enim, etſi facilis instrumenti crurum introductio, hæcce recolligere & adunire nullus valebit. Angulus enim quem efformant, perpetuam ſervat proportionem cum cochlearium extremorum arcus cordâ; quæ quidè corda majorem capitis fœtus diametrum nunc metitur. Patet ergò ad punctum coadunationis reduci non poſſe crura forcipis à ſe invicem nimiùm remota, quin partes matris violentius removeantur, extendantur & rumpantur. Prædictis in circumſtantiis, capitis inverſionem admodum neceſſariam [ſi quidem à pelvi majori in minorem nequaquàm delabitur niſi facie vel infrâ vel ſuprà objectâ] abſolvere forcipis ope ſi tentet embryulcus, nonne ab instrumenti curvaturâ pelvi minori adeò adverſâ, dum cochlearibus frons ſimul & occiput comprehenduntur, metuenda venit partium diſturbatio, offium capitis dimotio ac fractura? Quid plura! forcipi ſic appoſito, caput verè incuneatum nihilo cedere experti funt non pauci.

Minori in pelvi, ſi facies publi vel facro adhæreat immobilis, forcepe apprehendi partes copitis laterales fatemur, at reductis junctisque cruribus eâdem proportionem minuatur diameter capitis tranſverſa, quâ elongabitur anterior. Ab hoc preſſu quot reformidanda occurrant mala, coccygi, perinæo, vulvæ, veſicæ matris, ipſimet fœtui incumbentia, viderit Medicus.

In eâdem pelvi minori dùm caput, facie ad hoc vel illud latus obverſâ, irretitur, nec pauciora nec leviora funt à forcepe pertimeſcenda: quæ jam retuli-

mus, cum de capite diantus in angustias superioribus transversa impedito. Angustias in superioribus aut in plevi minore obliquè objecto capite, nedum utilis, graviora adauget impedimenta forceps, quippè qui caput jam elongatum magis ac magis producit lateribus validè compressis.

Hæc cum satis superque sint, quibus forcipis usum haud rarò impossibilem, sæpissimè noxiū esse comprobatur, ad vincti usuram & commoda devenimus.

I V.

VECTIS usuram variam necessariò imperant variæ incuneationis species & vari capitis situs: nec uni aut alteri parti indiscriminatim apponendum esse suadet iusta partium cognitio. Pro votis ut succedat, tria sunt tenenda: 1^o. Cochlearis intra fœtum & partes matris tuta intromissio, 2^o. ejus ad partem capitis, quæ mota totam molem cogere debeat, applicatio, 3^o. denique ea motus ratio quâ in caput agens vectis, illud foras eliminare queat.

Quæcumque sit incuneationis species, quæcumque causâ, cochleari vectis præbet aditum vel faciei dispositio, vel ars obstetricantis caput incuneatum digitis & pollice paululū hinc vel inde suprâ vel infrâ diducentis. Capitis partem cui vectis cochlear sit applicandum definire haud arduum erit attendenti, quamnam solidi speciem offerat caput fœtus per angustias vel superiores vel inferiores transeuntis. Occiput prius oblatum facies subsequitur, hinc caput conum effingit cuius apex seu occiput antrorsum, basis verò seu facies retrorsum. Jam verò quoties conibasis propellitur, movetur & juxta eamdem lineam illius apex. Basi ergo seu faciei parti infimæ, maxillæ nempe inferiori, admoveatur potentia, partem oppositam in motum adversum impellendam esse demonstrant mechanicae leges. Vi efficaci, quam ministrat vectis, prudenter utatur embryulcus, caveat ne, partibus matris tanquam fulcro incumbens, illi gravissimam inferat injuriā: at manui alterutri innixum vectem alterâ manu moveat & premat juxta primæ vectium classis axiomata, aut tertiæ classis, situ servato, manus caput fœtis inter & alteram manum fulcri-vices gerentem ponatur. Quâ sobrietate, ut ita dicam, elevandum, movendum & propellendum sit caput, verbis exprimere supervacaneum ducimus. Præcepta nonnullis exemplis dilucidare & confirmare satius videtur; unde quid in aliis prætermisiss circumstantiis embryulco vecte utenti sit agendum facillè quivis, non rudis, concludet.

Si capitis in angustias superioribus hærentis facies pubem aut sacrum directè, dextrum aut sinistrum latus obliquè respiciat, ita caput invertendum est ad unum vel ad alterum latus, ut sua major diameter diametro angustiarum transversæ sit serè parallela; caput enim per angustias superiores nunquam nisi obliquè descendere nemo nescit. Ut hæc fiat inversio; sinistra manus vectem, dextrâ ducente, immittit juxta lineam quæ matris cluni dextræ manubrium offerat, cochleare verò inter genam fœtis sinistram, & uteri ostii limbum proximum colloquet. Eadem sinistra manubrium moderatur & ad partes capitis fœtis laterales, levi motu & supra suum axem rotatu propellens, cochlearis introductioni favet. Ut vero capiti infantis applicatum cochleare, parti mobili incumbat, hoc dextra manus intropellit eo motu sapienter moderato qui 90 gradus describat: sicque maxillæ inferiori adaptetur. Vectis cochleare introductum monstrat axis instrumenti, qui sibi derelictus, ambarum angustiarum diametros anteriores fecit perpendiculariter; monstrat etiam illius in hoc situ à partibus maternis

contra-nitentibus immobilitas. Cochleari angulum maxillæ apprehensum certo edoctus obstetricans, dextrâ manu firmiter mediam vœtis partem continet & digitis sinistris parti parietalis dextri posteriori appositis, pollex verticem premens caput subleuat, ad latus sinistrum pellit occiput, dum vœtis ope, cujus caverna fœtus genam quasi includit, facies ad dexterum latus adigitur, sicque victis obicibus, truditur in pelvim. Hoc in situ fœtus diameter anterior in angustiarum transversæ diametri plano est parallela. Ad latus sinistrum, ubi convenientius videtur, quomodo caput sit inclinandum, mutato latere & mutatis manibus, quivis facillè intelliget. Sicque situi naturali redditum caput, dum modo nullis aliis irretiatur vitiis, naturæ enitenti committitur.

Transversâ hærente capite in angustis superioribus & ad latus sinistrum obversâ facie, contra pubim, si major est pressio quam contra sacrum, extremis dextris digitis caput in sacrum deprimitur, hæcque depressio dat locum introductioni cochlearis, sic dispositi ut manubrii pars inferior terræ obvertatur, juxta diametri anterioris directionem. Cochlearis, inter genam sinistram fœtus ac partes anteriores & laterales sinistras ostii uteri introducti, manubrium ad oppositum verticale punctum elevatur, arcum vel majorem vel minorem pro pubis curvaturâ descripturum. Quando fixus hæret vœtis, axemque habet plano symphysis ossium pubis obliquo parallelum, cochleare sinistro masseteri musculo fœtus esse applicatum constat. Tunc vœtis parti mediæ appositâ sinistrâ quæ fulcri immoti munus adimplet, dextra manubrium movens, caput leniter premit, & ad pelvim deducit.

Si ad sacrum magis hæret caput, inversâ vœtis introducendi ratione, eodem manuum exercitio idem produceretur effectus, caput in pelvim descendet, faciesque ad sacrum inclinabitur; posito tamen quòd ad illud faciliôr inclinatione tendat quam ad pubim. Ad hunc enim si facies magis quam ad sacrum vergat, huic propensionis faveat secunda introducendi vœtis methodus; sicque à collo detorquendo ac fœtu strangulando sese abstinebit embryulus.

Capitis in pelvi minore incuneati quicumque sit aspectus, eadem aut ferè similes, quas dîstabit occasio, leges sunt tenendæ. Methodum singulis incuneationis speciebus commodiorem & tutiorem exponere, & exercitio confirmare facilius nobis erit respondentibus, quàm scriptis depingere.

V.

VECTEM a Roonhuifen jam inventum, a medicis batavis laudatum, ab obstetricantibus vero, notæ optimæ, infidum ac noxium renunciatum atque repudiatum, denuò nos in medium proferre, & exsuscitare, ne credas. Roonhuifiano primâ fronte haud abfîmilis noster videtur, ac severior si fiat comparatio, hunc ab illo multis capitibus discrepare, in propatulo erit (1).

(1) Duabus ex paribus constat vœtis quem laudamus, cochleari nempe & manubrio. Cochleare fœcipis recti cochlearis figuram referens, juxta suam latitudinem & cavitatem inspectum, longitudinis pollices $7\frac{1}{2}$, latitudinis majoris pollicem 1 lineas 8, habet, crassitici lineas 2, fenestra longitudinis pollices $3\frac{1}{2}$ latitudinis vero majoris 8 lineas. Cochlearis cauda quæ manubrio includitur longitudinis pollices $4\frac{1}{2}$, latitudinis lineas 10 habet minor, manubrii latitudo major 14 lineas adimplet.

Vœtis à latere inspectus litteræ S. Romanæ Formam amulatur: duo igitur offert circulorum segmenta inæqualia quorum curvitates oppositæ in extremis junguntur, unde dux arcuum cordæ fingi possunt, corda cochlearis pollices 5, lineas 3 adæquat, cujus maxima ab arcu distantia pollicem 1 lineas 2. Linea ab extremitate instrumenti ducta ad cochlearis convexitatem cujus est tangens, ad punctum usque contactus protensa pollices 10 habet, ejus maxima ab arcu, cujus est corda, distantia perpendicularis lineas 10; unde facilis est estimatu utraque instrumenti curvædo.

Plurimis vitiiis foedatum veſtem Batavum meritò rejecerunt. Quàm fortiori jure; illius uſurpandi rationem, in tractatu, cui titulus eſt *inſtrumentum Roonhuiſiani ad partus inventio*, delineatam, damnamus impoſſibilem & noviam.

Aſt inquier, laborioſis partibus, à capite incuneato, ſufficiunt & ſuffecere forcipes, a peritis viris emendati, quorum uſus & certior & ſimplicior. Forcipes votis obſtrictantium nonnullorum ſatiſfeciffe non diſſimulatur. Verùm enim verò (omiffis de verâ incuneatione dubiis, capite præſertim craſſiſſimè ſolitam non ſuperante) non pauca occurrunt partus impedimenta, quæ veſti vix aditum permittant: tunc autem quântò difficilior utrique forcipum cochleari erit introitus! Quam ſæpe impoſſibilis crurum adunatio! Forcipe intromiſſo, caput amplexante, validè apprehenſus extrahitur infans, preſſionis, ſuccuſſionis, tractionis effectus nemo non reformidat. Dolent multi ſtrictiorem colli comprehenſionem, elongata cervicalia ligamenta, medullam ſpinalem diviſam, colli lacerationem, à trunco caput avulſum, &c. Contrà partibus in circumſtantiiſ veſtiſ nullo labore aut ſaltem levi introfertur, manu prudenti ductus & moderatus nec foetum nec matrem lædit, partumque expediri feliciter. Undè laudum, quibus veſtiſ Roonhuiſiani uſum extulit celeberrimus Vanſwieten (1); partem maximam liceat in veſtem noſtrum qui ſimplicior, mole minor, commodior, & cujus applicatio ſanioribus regitur legibus, refundere: Et concludere:

Ergò capite incuneato, veſtiſ forcipibus eſt antepoſtendus.

(1) Comment. in Herianni Boerhaave Aphoriſmos. Tom. 4. pag. 485. edit. Pariſ.

DOMINI DOCTORES DISPUTATURI.

M. Dominicus - Joannes-Baptiſta DE LA BICHE.	M. Bertrandus DUPUY.	M. Dionyſius PAUTIER DE LABREUILLE, SS. Delphini & Delphinæ dum viverent, Medicus Primarius.
M. Joannes-Baptiſta-Eugenia DUMANGIN.	M. Joannes COLOMBIER.	M. Natalis-Andræas Joannes-Bapt. CHESNEAU.
M. Thomas LEVACHER DE LA FEUTRIE, Anatomæ & artiſ obſtrictiæ in gratiam Matronarum Profeſſor deſignatus.	M. Joannes - Carolus DESESSARTZ.	M. Dionyſius - Claudius DOULCET.

Proponebat Pariſiſ CLAUDIUS-ANDRÆAS GOUBELLY, Pariſinus, Saluberrimæ Facultatiſ Medicinæ Pariſienſiſ Baccalaureus, Theſeos Auctor.
A. R. S. H. 1772. A SEXTA AD MERIDIEM.

Typis Quillan, Saluberrimæ Facultatiſ Medicinæ Typographi 1772.